

 <p>Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p>	<p><b>Preparazione Procedure Endoscopiche Tratto Digestivo Superiore</b></p> <p><b>ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ECOENDOSCOPIA(EUS), ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA (VCE), ENTEROSCOPIA ANTEROGRAFA CON DOPPIO PALLONE (DBE)</b></p>	<p>Rev. 2 10-09-2023</p>	<p>Pag. 1 di 2</p>
		<p><b>ENDO-FE-002</b></p>	

Gentile Signora/e,

Per eseguire una procedura endoscopica del tratto digestivo superiore è fondamentale una corretta preparazione.

Qui di seguito troverà la preparazione specifica per l'esame che dovrà eseguire, dopo aver individuato la procedura che dovrà eseguire (verifichi la prescrizione medica/foglio di prenotazione) segua attentamente le indicazioni prescritte per la corretta preparazione.

**IL GIORNO DELLA PROCEDURA:** Venga accompagnato, porti con sé tutti i documenti relativi a ricoveri, interventi chirurgici, esami ematochimici, esami endoscopici e radiologici precedenti.

Le verranno chieste informazioni relative a terapie precedenti ed in corso.

Ci segnali eventuali sue allergie a farmaci, se portatore di pacemaker, o se affetto da glaucoma.

**È preferibile indossare abbigliamento comodo, rimuovere protesi mobili e oggetti metallici** (collane, bracciali, orecchini, anelli e orologio etc.).

**TERMINATA LA PROCEDURA** Rimarrà presso la SC di Endoscopia fino a completa ripresa della lucidità.

Le procedure endoscopiche vengono eseguite in sedazione, per il ritorno a casa è **obbligatorio essere accompagnati da persona adulta e responsabile.**

Per il resto della giornata non dovrà guidare la macchina, lavorare su macchinari o prendere decisioni importanti, dal momento che l'effetto tardivo dei sedativi può rallentare i riflessi e ridurre la Sua capacità di giudizio.

### **PAZIENTI IN TERAPIA CON FARMACI ANTICOAGULANTI O ANTIAGGREGANTI:**

Si consiglia la sospensione della terapia anticoagulante/antiaggregante nell'eventualità che la procedura diventi operativa (es. rimozione di polipi), tuttavia è consigliabile consultare il medico curante e/o il prescrittore per stabilire opportunità, modalità e la durata di sospensione della terapia.

## **PREPARAZIONE DA ESEGUIRE NEL CASO DI ESECUZIONE DI**

### **1. ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA**

- La sera prima della procedura: è ammessa una cena leggera entro le ore 20.00 poi digiuno assoluto dai cibi solidi.
- Il giorno della procedura: Digiuno dai cibi solidi, è ammesso bere liquidi chiari (acqua the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.

### **2. ECOENDOSCOPIA DEL PANCREAS & ECOENDOSCOPIA SUPERIORE (EUS)**

- La sera prima della procedura: è ammessa una cena leggera entro le ore 20.00 poi digiuno assoluto dai cibi solidi.
- Il giorno della procedura: Digiuno dai cibi solidi, è ammesso bere liquidi chiari (acqua the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.

 <p>Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p>	<b>Preparazione Procedure Endoscopiche Tratto Digestivo Superiore</b>	<b>Rev. 2</b> <b>10-09-2023</b>	<b>Pag. 2 di 2</b>
		<b>ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ECOENDOSCOPIA(EUS), ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA (VCE), ENTEROSCOPIA ANTEROGRADA CON DOPPIO PALLONE (DBE)</b>	

### 3. ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA (VCE)

**Indispensabile sospendere i medicinali a base di ferro 7 giorni prima dell'indagine**

**Controindicazioni:** stenosi a livello gastrointestinale, gravidanza, disturbi della deglutizione e della motilità gastrointestinale.

**Pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantabile:** indispensabile il parere favorevole scritto del cardiologo.

**Pazienti sottoposti a interventi di resezione gastrointestinale:** contattare il servizio di endoscopia 0392333407

**PREPARAZIONE INTESTINALE** Acquistare uno dei seguenti prodotti in farmacia:

**A) POLIETILENGLICOLE PEG 4000** (2 LITRI) – (per esempio. **Selgesse o Isocolan**)

- La sera prima della procedura:  
Digiuno da cibi solidi, bere i 2 litri di soluzione dalle ore 19.00, 250 ml ogni quarto d'ora per 2 ore.
- Il giorno della procedura:  
Digiuno dai cibi solidi, è ammesso bere liquidi chiari (acqua the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.

**B) PLENVU** (1 LITRO) - **Controindicato in caso di fenilchetonuria e favismo**

- Il giorno prima della procedura:  
Si può consumare una leggera colazione seguita da un pranzo leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14.00  
Alle ore 20.00 sciogliere la DOSE 1 (1 busta) in ½ Litro di acqua e bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi in 30-40 minuti (meglio fresca, messa in frigorifero dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, tè, camomilla).
- Il giorno della procedura:  
Digiuno da cibi solidi (non è ammessa la colazione), **4 ore prima della procedura**, sciogliere la DOSE 2 (busta A+ busta B) in ½ Litro di acqua e bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi in 30-40 minuti (meglio fresca messa in frigorifero dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, tè, camomilla). In caso di difficoltà (nausea) si consiglia di rallentare l'assunzione; è inoltre possibile assumere la preparazione con l'aiuto di una cannuccia ed intervallare mezzo bicchiere di preparazione con dei liquidi chiari.

### 4. ENTEROSCOPIA PER VIA ANTEROGRADA CON DOPPIO PALLONE (DBE)

- La sera prima della procedura: è ammessa una cena leggera entro le ore 20.00 poi digiuno assoluto dai cibi solidi.
- Il giorno della procedura: Digiuno dai cibi solidi, è ammesso bere liquidi chiari (acqua the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.