

 Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	تعليمات لجمع عينة البول المفاجئ أبحاث البروتين بنس جونزBENCE JONES	Rev. 0 Del 28.03.2024	Pag. 1 di 1
		LAG-AMB-FE-010	

سيدتي العزيزة / سيدي المحترم

البحث عن بروتين بنس جونز Bence Jones في البول هو اختبار يتم إجراؤه في حالة الاشتباه السريري ولرصد داء السلسلة الثقيلة في خلايا البلازما. في ظل الظروف الفسيولوجية، يغيب بروتين بنس جونز Bence Jones في البول.

لذلك، من أجل جمع العينات بشكل صحيح، نوصي باتتباع التعليمات التالية:

المواد اللازمة للتجميع: • يُنصح باستخدام الحاوية المقدمة مجاناً من قبل موظفي الرعاية الصحية في مركز فحص الدم San Gerardo dei Tintori IRCCS من الساعة 7.00 صباحاً حتى 15.00 مساءً. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام وعاء معقم للبول يمكن شراؤه من الصيدلية (الشكل 2). • يجب عدم غسل الحاوية أو استخدامها مطلقاً. • لا تستخدم أي نوع آخر من الحاويات غير المناسبة.	
تحضير المريض: • <u>لا</u> يتطلب الاختبار تحضيراً من المريض	
لجمع العينة، اتبع التعليمات التالية: • اغسل يديك جيداً • اغسل أعضائك التناسلية بالماء الجاري، ولا تستخدم المنظفات المطهرة • جفف أعضائك التناسلية جيداً بمنشفة نظيفة • تخلص من التدفق الأول من البول، وبدون مقاطعة التبول، ضع الحاوية لتجميع التبار الثاني، الجزء الأوسط من البول، مما يؤدي إلى التخلص من الجزء الأخير من التبول. • يوصى بجمع الكمية المثالية من البول بين 10 و 30 مل. • أغلق الحاوية دون لمسها بداخلها.	 الشكل 2: حاوية مناسبة لجمع البول
توقيت تسليم العينة: • يوصى بتسليم العينة بين الساعة 7 و 9.30 صباحاً إلى الغرفة المخصصة لتسليم المواد البيولوجية في مركز أخذ العينات	
مراجع: – https://www.labtestsonline.it – باتريسيا ناتالي Patrizia Natali ، جيوفاني سيجليانا Giovanni Cigliana ، مارسيليا سافويا Marcella Savoia وآخرون. مراجعة وتحديث وثيقة الإجماع SIBioC لأبحاث بروتين Bence Jones وتقديره الكمي. الكيمياء الحيوية السريرية، 2020.	