

بالنسبة لجرعة الكاتيكولامينات، والميتانفرين، وحمض 5-هيدروكسي إندول أسيتيك، وحمض الهوموفانيليك، وحمض الفانيليل مانديليك، والدوبامين، والسيروتونين، وأوكسالوريا، استخدم فقط الحاويات التي توفرها عيادة أخذ عينات الدم. من الممكن سحب حاوية تجميع البول على مدار 24 ساعة مجاناً في نقطة التجميع والذي يحمل العلامة التالية.



تحذير: يحتوي على حمض. احفظ الحاوية بعيداً عن متناول الأطفال.

في حالة الجمع ذا الحجم الذي يزيد عن 3 لترات، استخدم حاوية ثانية مناسبة.

في الأيام الأربعة التي تسبق الجمع، باستثناء عندما تكون هناك حاجة إلى أوكسالوريا، لا تتناول الأطعمة التي تحتوي على الكابسامين (الفلل الحار، تاباسكو، البابريكا، صلصة الفلفل الحار)، عصائر الفاكهة، المشمش، الباذنجان، الكيوي، الكشمش، المكسرات، الموز، الشوكولاته، الأفوكادو، الأناناس والخوخ والطماطم والفانيلين والكافيين والشاي والمشروبات الكحولية.

1	عندما تستيقظ (على سبيل المثال الساعة 6:00 صباحاً) قم بإفراغ المثانة عن طريق التخلص من البول في المراض.	
2	- اجمع بول اليوم بأكمله في الحاوية، بما في ذلك بول الصباح الأول من اليوم التالي (التبول الأول في الصباح) - قم بتخزينه في مكان بارد وجاف. - في نهاية الجمع، قم بهز الصندوق بلطف لخلط البول	
3	- تحقق من حجم البول المتجمع على المقياس المتدرج للحاوية. - اكتب القيمة المتواجدة من البول في الحاوية (معبراً عنها بالمليتر) على ملصق أنبوب الاختبار	
4	قم بإزالة الملصق الموجود على الغطاء الصغير للحاوية	
5	- أدخل أنبوب الاختبار بحيث يكون الغطاء البرتقالي متجهاً للأسفل واضغط بقوة: سيتدفق البول تلقائياً إلى أنبوب الاختبار؛ انتظر حتى يتم ملؤه بالكامل. - تخلص من البول المتبقي. - قم بتسليم الأنبوب إلى مركز التجميع في صباح يوم استكمال التجميع. إذا كنت في شك، قم بتسليم الحاوية مباشرة إلى موظفي مركز أخذ العينات.	