- *Gentile Utente*, la determinazione della Calprotectina fecale è un esame utile a valutare la presenza di infiammazione a livello intestinale, ed è indicato nel sospetto di patologie come le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) o per il **monitoraggio della loro attività**. Per la corretta esecuzione dell'esame Le raccomandiamo di seguire le seguenti istruzioni**.**
- Si raccomanda di consegnare il campione tra le **ore 7 e le ore 9:30** presso la stanza dedicata alla consegna dei materiali biologici del Centro prelievi.
- **ATTENZIONE TENERE LONTANO DALLA PORTATAT DEI BAMBINI.**

Come raccogliere il campione di FECI

1. **Svitare ed estrarre il tappo del flacone di raccolta**
2. **Strisciare l'asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale**
3. **Inserire l'asticella nel flacone**
4. **Riavvitare ed agitare**

- **Cosa fare**
  - Non è necessario il digiuno né seguire diete particolari.
  - Le feci di qualsiasi consistenza sono idonee all'esame.
  - È consigliato raccogliere il campione al mattino; in caso contrario, per i successivi esami, raccogliere sempre nello stesso arco orario.
  - In caso di richiesta di più campioni, raccoglierli in giorni diversi, su scariche differenti.
  - Raccogliere le feci in un contenitore pulito e asciutto, evitando il contatto con l'acqua del WC (si consiglia di usare della carta o un raccoglitore idoneo).
- **Cosa evitare**
  - Non raccogliere il campione se è presente sangue visibile nelle feci o nelle urine (ad esempio in caso di mestruazioni, emorroidi sanguinanti o infezioni urinarie).
  - Evitare l'uso di farmaci che possono interferire con l'esame:
    - Inibitori di Pompa Protonica (IPP): sospendere almeno 4 settimane prima.
    - Antinfiammatori Steroidei: sospendere almeno 2 settimane prima, salvo diversa indicazione del medico curante.
- **Dopo la raccolta**
  - Conservare il flacone in frigorifero e non oltre 72 ore.
  - Trascorso tale periodo, si raccomanda di consegnare il campione il prima possibile al Centro Prelievi, inserito nell'apposito sacchetto di trasporto fornito dal laboratorio.
- **Precauzioni**
  - Non ingerire il liquido contenuto nel flacone.
  - In caso di contatto accidentale con occhi, bocca o pelle, sciacquare abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare un medico.

1.

2.

3.

4.