



FICHE D'INFORMATION AU PATIENT

Dosage de la Calprotectine fécale

- *Cher Utilisateur*, la détermination de la calprotectine fécale est un examen utile pour évaluer la présence d'une inflammation au niveau intestinal et il est indiqué en cas de suspicion de pathologies telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) ou pour **surveiller leur activité**. Pour effectuer correctement l'examen, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes.
- Il est recommandé de remettre l'échantillon entre **7h00 et 9h30** dans la salle réservée à la remise des échantillons biologiques du Centre de prélèvements.
- **ATTENTION : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Comment prélever l'échantillon de SELLES

1. Dévisser et extraire le bouchon du flacon de prélèvement
2. Passer la tige sur les selles à plusieurs reprises, horizontalement et verticalement
3. Introduire la tige dans le flacon
4. Revisser et agiter

• Que faire

- Aucun jeûne n'est requis ni de suivre un régime alimentaire particulier.
- Les selles de toute consistance constituent un échantillon adéquat pour l'examen.
- Il est recommandé de prélever l'échantillon le matin ; en cas contraire, pour les examens suivants, prélevez toujours à la même heure.
- En cas de demande de plusieurs échantillons, veuillez les prélever à des jours différents, sur des selles différentes.
- Veuillez recueillir les selles dans un contenant propre et sec, en évitant tout contact avec l'eau des toilettes (il est recommandé d'utiliser du papier ou un récipient approprié).

• À éviter


- Veuillez ne pas prélever l'échantillon si du sang est visible dans les selles ou dans l'urine (par exemple en cas de menstruations, d'hémorroïdes saignantes ou d'infections urinaires).
- Évitez de prendre des médicaments pouvant interférer avec l'examen :
 - Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP) : veuillez interrompre le traitement au moins 4 semaines avant.
 - Anti-inflammatoires Stéroïdes : veuillez interrompre le traitement au moins 2 semaines avant, sauf indication contraire de votre médecin traitant.

• Après le prélèvement

- Conserver le flacon au réfrigérateur et pas plus de 72 heures.
- Une fois ce délai écoulé, il est recommandé de remettre l'échantillon dès que possible au Centre de Prélèvement, dans le sachet de transport prévu à cet effet fourni par le laboratoire.

• Précautions

- Veuillez ne pas ingérer le liquide contenu dans le flacon.
- En cas de contact accidentel avec les yeux, la bouche ou la peau, rincer abondamment à l'eau et, si nécessaire, consulter un médecin.



1.



2.



3.



4.